

観察した鳥類チェックリスト

- | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| ★キジ目 | ★ツル目 | ★ハヤブサ目 | □ ツグミ |
| ・キジ科 | □ クイナ | ・ハヤブサ科 | □ ジョウビタキ |
| □ キジ | □ バン | □ チョウゲンボウ | ・スズメ科 |
| ★カモ目 | □ オオバン | □ ハヤブサ | □ スズメ |
| ・カモ科 | ★チドリ目 | ★スズメ目 | ・セキレイ科 |
| □ コブハクチョウ | ・チドリ科 | ・モズ科 | □ キセキレイ |
| □ オカヨシガモ | □ タゲリ | □ モズ | □ ハクセキレイ |
| □ ヨシガモ | □ ムナグロ | ・カラス科 | □ セグロセキレイ |
| □ ヒドリガモ | □ コチドリ | □ カケス | □ タヒバリ |
| □ マガモ | ・セイタカシギ科 | □ オナガ | ・アトリ科 |
| □ カルガモ | □ セイタカシギ | □ ハシボソガラス | □ カワラヒワ |
| □ ハシビロガモ | ・シギ科 | □ ハシブトガラス | □ アトリ |
| □ オナガガモ | □ タシギ | ・シジュウカラ科 | □ ウソ |
| □ コガモ | □ イソシギ | □ ヤマガラ | □ シメ |
| □ ホシハジロ | ・タマシギ科 | □ シジュウカラ | □ コイカル |
| □ キンクロハジロ | □ タマシギ | ・ヒバリ科 | ・ホオジロ科 |
| □ ミコアイサ | ・カモメ科 | □ ヒバリ | □ ホオジロ |
| ★カイツブリ目 | □ ユリカモメ | ツバメ科 | □ カシラダカ |
| ・カイツブリ科 | □ セグロカモメ | □ ツバメ | □ アオジ |
| □ カイツブリ | □ オオセグロカモメ | ・ヒヨドリ科 | □ オオジュリン |
| □ カンムリカイツブリ | ★タカ目 | □ ヒヨドリ | □ |
| □ ミミカイツブリ | ・ミサゴ科 | ・ウグイス科 | □ |
| □ ハジロカイツブリ | □ ミサゴ | □ ウグイス | □ |
| ★ハト目 | ・タカ科 | ・エナガ科 | □ |
| ・ハト科 | □ トビ | □ エナガ | □ |
| □ キジバト | □ チュウヒ | ・メジロ科 | |
| ★カツオドリ目 | □ ツミ | □ メジロ | (外来種や家禽) |
| □ カワウ | □ ハイタカ | ・ヨシキリ科 | □ バリケン |
| ★ペリカン目 | □ オオタカ | □ オオヨシキリ | □ ガチョウ |
| ・サギ科 | □ ノスリ | ・セッカ科 | □ アヒル |
| □ ヨシゴイ | ★ブッポウソウ目 | □ セッカ | □ ドバト |
| □ ゴイサギ | ・カワセミ科 | ・ムクドリ科 | |
| □ アマサギ | □ カワセミ | □ ムクドリ | |
| □ アオサギ | ★キツツキ目 | ・ヒタキ科 | |
| □ ダイサギ | ・キツツキ科 | □ シロハラ | |
| □ チュウサギ | □ コゲラ | □ アカハラ | |
| □ コサギ | | | |

7

【7月のテーマ】 夏の水辺の生きもの

案内人: 石原直子、岡廣志(鳥の博物館市民スタッフ)



我孫子でみられる主なカエル

田んぼで姿をみたり、鳴き声を聞いたカエルにチェックを入れよう



ニホンアマガエル

体長: 3~4cm



トウキョウダルマガエル

体長: 4~7cm



シュレーゲルアオガエル

体長: 3~5cm



ニホンアカガエル

体長: 3~7cm



アズマヒキガエル

体長: 8~15cm



ウシガエル

体長: 15~18cm

ニホンアマガエル 分布 日本(北海道~九州) 朝鮮・中国東部
 指 前足4本・後足5本 吸盤あり 冬は冬眠する。
 産卵 5月~6月 250~500卵 1卵は1.5~3.0mm 産卵後1ヶ月で変態
 鳴くのは石を。 雌が大きい
 地上から不到上を 活動範囲は広い



アマガエル 20~45mm
 (黄緑色だが周囲の色に合わせて変わる。目の後ろに黒い帯状の模様がある)

2015年7月11日(土)

両生類ってどんな生きものなの？

(例) アズマヒキガエル



今日のがたんでみられた生物にチェックを入れよう



アズマヒキガエル (カマゲイル)

分布 日本(東北地方から近畿地方、
 島根県東部までの山陰地方北部に
 自然分布)固有亜種。
 伊豆下島・佐渡島、北海道などに移入



産卵期 2月中旬~4月上旬、池田らは「ヒモ柱」の卵を産む。
 1,500~8000個 親は産卵後春眠をする。

オタマジャクシは黒く、5~11cm、仔ガエルに変態したときの
 2ヶ月~2ヶ月半で変態する。体長は5~8cmである

蛙合戦 繁殖期、多くのオスが1匹のメスを巡って奪い合う。