

⋒新型コロナウイルス感染症予防対策のお願い

◎3つの密を避けましょう

●換気の悪い

2多数が集まる 密集場所

❸間近で会話や 発声をする







2メートル以上の間隔をできるだけ確保しましょう

人と人が近い距離で一定時間以上接触が続く環境は、感染を拡大させ るリスクが高いとされています。一人一人の予防と拡大防止対策をお願 いします。

◎こまめな手洗い

外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いま しょう。



流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。







・爪は短く切っておきましょう

手の甲をのばすようにこすります。

6



指の間を洗います。 親指と手のひらをねじり洗いします。

手首も忘れずに洗います。


石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータ オルでよく拭き取って乾かします。

◎咳エチケット

周りの人への感染を防ぐため、咳やくしゃみをするときは、マスクや ティッシュ・ハンカチ、服の袖で□・鼻を覆いましょう。













咳やくしゃみを 手でおさえる

マスクを着用する (ロ·鼻を覆う)

ティッシュ・ハンカチで 口・鼻を覆う

袖で□・鼻を覆う

正しいマスクの着用



確実に覆う





鼻まで覆う

イラストの出典:首相官邸ホームページ

○身のまわりを清潔にしましょう

石けんやハンドソープを使った 丁寧な手洗いを行ってください。




手洗いを丁寧に行うことで、 十分にウイルスを除去できます。 さらにアルコール消毒液を 使用する必要はありません。

手洗い		残存ウイルス
手洗いなし		約 100万個
石けんや ハンドソープで 10 秒もみ洗い後 流水で 15 秒すすぐ	1 0	約 0.001% (数十個)
	2回 繰り返す	約 0.0001% (数個)

(森功次他:感染症学雑誌、80:496-500,2006 から作成)

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、 アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

(新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスなどにも有効です)



食器や箸などは、80℃の熱水に 10分間さらすと消毒ができます。 火傷に注意してください。



濃度0.05% に薄めた上で、拭くと 消毒ができます。

ハイター、ブリーチなど下記に作 り方を表示しています。

- ・家事用手袋を着用して行ってください。
- ・金属は腐食することがあります。・換気をしてください。
- ・他の薬品と混ぜないでください。

〈参考〉0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。 商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください

メーカー (五十音順)	商品名	作り方の例	
花王	ハイター	水1Lに本商品 25mL(商品付属のキャップ 1 杯)	
	キッチンハイター	水1Lに本商品 25mL(商品付属のキャップ 1 杯)	
カネヨ石鹸	カネヨブリーチ	水1Lに本商品 10mL(商品付属のキャップ 1/2 杯)	
	カネヨキッチンブリーチ	水 1 L に本商品 10mL(商品付属のキャップ 1/2 杯)	
ミツエイ	ブリーチ	水 1 L に本商品 10mL(商品付属のキャップ 1/2 杯)	
	キッチンブリーチ	水 1 L に本商品 10mL(商品付属のキャップ 1/2 杯)	

●使用にあたっては、商品パッケージやホームページの説明をご確認ください。●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。

表に無い場合、商品パッケージやホームページの説明にしたがってご使用ください。

作り方の出典: 厚生労働省ホームページ

狂犬病予防注射(集合注射)を中止

新型コロナウイルスの感染症の影響により、4月27日例から予定していた狂犬病集合注射を中止します。今年度は個別の動物病院での接種をお願いしま す。なお、飼い主の方に発熱や咳、倦怠感などの症状がある場合は、動物病院への来院を自粛し、体調の良い時に来院いただくようお願いします。

圕 健康づくり支援課☎7185-1126